

CONTACT Dr. Paul Pardon
TEL. +32(0)474 85 19 33
E-MAIL paul.pardon@health.fgov.be

Fiche coronavirus COVID-19 voor ambulanciers (update: 11/03/2020)

Causaal agens		
Virus (Coronavirus : SARS-CoV-2)		
Criteria : Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met een acute luchtweginfectie (bovenste of onderste luchtwegen), of verergering van chronische symptomen (zie gevalsdefinitie).		
Wijze van overdracht		
Respiratoir		
Isolatietype		
<p>Respiratoire isolatie: handschoenen en chirurgisch masker + beschermende wegwerpkledij (gele overjas en veiligheidsbril) als er gevaar bestaat voor projectie of contact met lichaamsvloeistoffen. Als het doel van de missie niet duidelijk is, doe dan uit voorzorg uw masker op voordat u de patiënt benadert of houd een afstand van 1,5 m van de anamnese van de patiënt.</p> <p>Patiënt voor transport: handhygiëne met hydro-alcoholische oplossing (of zeep en water indien mogelijk) en chirurgisch masker.</p> <p>Als de patiënt het masker tijdens het hele transport heeft opgehouden, is er geen speciale decontaminatie nodig. Desinfecteer alleen oppervlakken. Wikkel de patiënt in een laken om het contact met de ambulance te beperken. Indien O₂ nodig is: 5l/min via zuurstofbril + chirurgisch masker voor patiënt.</p>		
Voor vervoer binnen 112-systeem	<p>Verwittig 112 en het ziekenhuis van bestemming via 112; verwijs door naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis na voorafgaand telefonisch akkoord.</p> <p>NB : Geen MUG vanaf het begin, tenzij de toestand van de patiënt dit vereist. MUG-begeleiding gebeurt in functie van het oordeel van de MUG-arts.</p>	
Voor niet dringend patiëntenvervoer	Controleer of de bestemming voorbereid is de patiënt te ontvangen.	
Maatregelen na interventie		
Voertuig	Zie interne procedure voor dagelijkse reiniging (Voorbeeld: procedure 1). Indien geen beschermingsmaatregelen genomen werden: zie interne procedure voor maandelijke reiniging (Voorbeeld: procedure 2).	
Materiaal	Eenmalig gebruik	Zie interne procedure voor " besmet afval ". Absoluut alles elimineren in 'geel' circuit, hetzij in eigen voorziening, hetzij in ziekenhuis.
	Ander	Zie interne procedure (volgens classificatie (niet-kritiek; half-kritiek of kritiek): gereinigd; gedesinfecteerd; gesteriliseerd).
Personeel	Handhygiëne. Als de ambulancier symptomen van COVID-19 vertoont , moet hij naar een dokter gaan om een test uit te voeren en thuis op de resultaten wachten (zie procedure " huisartsen " of " ziekenhuis "). NB: Het is niet langer nodig om uw contactgegevens in het ziekenhuis achter te laten, omdat de mogelijke gevallen niet langer systematisch getest worden.	
Kleding	Lakens in contact met de patiënt	Zie interne procedure voor " besmet linnen ". Verplicht mee te geven met patiënt aan ziekenhuis.
	Persoonlijke bezittingen van ambulanciers	Als kleren bevuild zijn: verwissel en was ze volgens interne procedure voor " besmet linnen ". Veiligheidskleding: grijze zak voor verbranding.
Risico's voor collega's / familie van de ambulancier : -		

Op de website www.info-coronavirus.be vindt u informatie en veelgestelde vragen over het nieuwe coronavirus.

Hoogachtend,



Dr. Paul Pardon
Chief Medical Officer
Voorzitter Risk Management Group