

Monkeypox - Apenpokken (MPX)

Epidemiologische situatie op 19 juli 2022

Achtergrond


Monkeypox of Apenpokken (MPX) wordt veroorzaakt door het monkeypoxvirus (MPXV), dat behoort tot de familie van de orthopoxvirussen (waartoe ook het pokkenvirus behoort). Tot nu toe kwam de ziekte vooral voor in beboste delen van Centraal- en West-Afrika, met sporadisch gevallen in andere landen, gelinkt aan een reis naar deze gebieden. Sinds begin mei 2022 verspreidt de ziekte zich echter in Europa en daarbuiten, waarbij besmettingen vooral voorkomen bij mannen die seksuele contacten hebben met mannen (MSM), maar niet uitsluitend.

Epidemiologie in België

Op 18 juli 2022 werden er door de regionale administraties/overheden in totaal 311 bevestigde gevallen en één waarschijnlijk geval van Apenpokken gemeld in België. Het gaat om 179 gevallen in Vlaanderen (57%), 98 gevallen in Brussel (31%) en 35 gevallen in Wallonië (11%).

De figuur hieronder geeft de verspreiding weer per regio, en over verloop van de tijd. Het meest recent gemelde geval (waarvoor de informatie beschikbaar is) gaf aan symptomen te ervaren op 12 juli. Indien de datum van start van de symptomen ongekend is, wordt de datum van diagnose of van melding weergegeven.

Figuur 1: Aantal gevallen per regio in functie van de start van symptomen, sedert 10 mei 2022, België



Alle gevallen zijn mannen, tussen 20 en 65 jaar oud.

Informatie over de symptomen is gekend voor 275 personen (88 %). Zo goed als alle patiënten (97 %) vertoonden een huiduitslag, en 74 % had ook algemene symptomen zoals koorts, algemeen onwel zijn, opgezwollen lymfeklieren,

Huidletsels kwamen vooral anogenitaal voor (n=202, 75 %). Twintig van de 284 personen (7%) waarvoor de informatie gekend is, werden gehospitaliseerd, 15 omwille van de behandeling (waarvan 1 persoon met een onderliggende immuunstoornis), 2 personen omdat thuisisolatie niet mogelijk was, en 3 waarvoor de reden niet gekend was.

De wijze waarop het virus vermoedelijk werd overgedragen (informatie gekend voor 244 personen) was voornamelijk via seksueel contact tussen mannen (94 %).

Informatie over de vermoedelijke plaats of context van besmetting was gekend voor 226 personen. Hiervan betreft het voor 48 personen (21 %) een deelname aan een groot event waar er seksuele contacten waren. Deze events vonden zowel in België plaats als in het buitenland. Een andere mogelijke seksuele context (zoals een sekssauna of een andere privésetting) werd geïdentificeerd voor 54 personen (17 %), terwijl aanwezigheid op een feestje of een andere activiteit zonder seksueel contact werd gerapporteerd door 17 personen (6 %). In dit laatste geval gebeurde de overdracht mogelijk van persoon tot persoon door zeer nauw, maar niet-seksueel contact.

Een limitatie bij het verzamelen en de interpretatie van deze gegevens is dat het om zeer gevoelige informatie gaat.

Meer informatie

Op deze [Sciensano webpagina](#) wordt informatie voor gezondheidswerkers meegedeeld. De richtlijnen kunnen mogelijk evolueren naargelang het vooruitschrijdend wetenschappelijk inzicht en de nationale en internationale situatie, en de documenten zullen indien nodig aangepast worden.

Informatie voor het grote publiek is beschikbaar op de website van [Agentschap Zorg en Gezondheid](#).