

België

Mazelen – Stijging in Wallonië

Sinds enkele weken stijgt het aantal mazelengevallen in Wallonië, met name in de regio Charleroi, Geldenaken, Namen en Verviers. Sinds halverwege december 2016 zijn er meer dan 75 gevallen gemeld aan de cel voor de surveillance van infectieziekten van het Agence pour une Vie de Qualité (AViQ). Het eerste geïdentificeerde geval van deze epidemie was een geïmporteerd geval uit Roemenië. De meerderheid van de gevallen waren niet gevaccineerd. Een kwart van de gevallen had betrekking op kinderen jonger dan 5 jaar. In een derde van de gevallen was opname nodig wegens complicaties zoals pneumonie, hepatitis, pancreatitis of dehydratatie. Het nationaal referentiecentrum voor mazelen (WIV-ISP) identificeerde het genotype B3. Eind 2016 was B3 in omloop in Roemenië, Italië en Oostenrijk. Vijf gezondheidswerkers ontwikkelden een zorggerelateerde mazelen. Het is cruciaal dat artsen snel elk verdacht geval van mazelen (catarrale fase met rinitis, conjunctivitis, hoest, hoge koorts, gevolgd door een maculopapulaire huiduitslag met cefalocaudale evolutie) melden aan de regionale teams voor infectieziektebestrijding. Een snelle melding maakt het mogelijk om risicopersonen in de omgeving van een geval op te sporen en post-expositievaccinatie binnen de 72 uur na het contact aan te bieden. Snelle isolatie in de wachttijd van personen met koorts en een huiduitslag, zal het aantal secundaire gevallen inperken. Serologie en PCR kan bepaald worden via een speekseltest. [Hier](#) vindt u meer informatie over de speekseltest. Het persbericht van AViQ kan u [hier](#) lezen.

Listeria – Aanbevelingen inzake de problematiek van listeriose bij specifieke en kwetsbare doelgroepen

De Hoge Gezondheidsraad bracht samen met het wetenschappelijk comité van het FAVV een advies uit in verband met risico communicatie rond listeriose in kwetsbare groepen (andere dan zwangere vrouwen). Volgens dit advies moeten voedingsaanbevelingen gericht worden tot patiënten met kanker, met immuunziekten, met immuunsuppressie in het kader van een medische behandeling, die hemodialyse ondergaan, die lijden aan levercirrose, en die maagzuurremmers gebruiken. Ook jongere volwassenen met deze ziektes moeten deel uitmaken van deze preventie. Het advies bevat verder een omschrijving van risico producten en geeft aan welke alternatieve producten genuttigd kunnen worden. Het integrale advies vindt u [hier](#).

Tuberculose - 24 maart: wereldduberculosedag

Op wereldduberculosedag roept de WGO de landen en de partners dit jaar op om samen een einde te stellen aan de ziekte. De uitroeiing van tuberculose tegen 2030 is één van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Ook al heeft de strijd tegen tuberculose grote vooruitgang geboekt -sinds 2000 zijn er 43 miljoen levens gered- blijven er elke dag wereldwijd meer dan 4000 mensen sterven aan deze infectieziekte. In 2014 waren er in België 959 tuberculose meldingen en was de incidentie hiermee de laagste ooit geregistreerd met 8,6 per 100.000 inwoners. In het kader van de wereldduberculose dag, hadden wij graag het werk van dr. [Armand Van Deun](#) van het [Tropisch Instituut Geneeskunde](#) vermeld, die een kortere behandeling voor multiresistente tuberculose (TB-MDR) introduceerde op 12 mei 2016. Daardoor verkort de behandeling voor TB-MR van 20 maanden naar 9 maanden, met een hoger slaagcijfer, meer mensen die de behandeling afmaken en een lagere kost per patiënt. In mei 2016 wijzigde de WGO haar [internationale richtlijnen](#) voor de behandeling van TB-MR met de invoering van het [schema](#) ontwikkeld door dr. Van Deun als standaardbehandeling. Verder zijn er ook twee interessant symposia in Brussel op 24 maart: u kan zich [hier](#) inschrijven om meer te weten over de veranderingen in de richtlijn van latente tuberculose infectie (LTBI), of voor een tweede symposium georganiseerd door het FARES om de [avant-première van de 'Camille Guérin et le BCG'](#) te zien.

Schistosomiase – Schistosomiase onder Belgische toeristen in Zuid-Afrika

Er werd schistosomiase vastgesteld bij 33 Belgen die naar Zuid-Afrika waren [gereisd](#) tussen 26 december 2016 en 15 januari 2017. De toeristen werden blootgesteld bij het baden in de Whiteriver, in het noorden van Kwazulu-Natal, op de grens met Swaziland. De ziekte staat erom bekend sterk geografische gelokaliseerd te zijn en werd nooit eerder in dit gebied gemeld. De symptomen begonnen 21 dagen na de blootstelling en uitten zich bij de meeste patiënten onder de vorm van koorts, buikpijn en langdurige hoofdpijn. Schistosomiase (bilharziose) is een chronische parasitose veroorzaakt door trematoden. De infectie treedt op wanneer de larven van de parasiet, afgezet door slakken in zoet water (intermediaire gastheer), in de huid dringen van personen die in contact komen met besmet water. Er bestaan twee hoofdvormen van schistosomiase: de intestinale vorm (buikpijn, diarree en bloederige stoelgang) en de urogenitale vorm. Het risico op voorkomen van schistosomiase in Europa is heel klein omdat de gastheer, de Bulinusslak, in de meeste Europese landen niet voorkomt en door de lage winterse temperaturen. Er wordt sterk aanbevolen om niet in zoet water te baden of te waden tijdens een reis naar Zuid-Afrika of [andere gebieden](#) waar schistosomiase circuleert.

Europa

Nuttig hulpmiddel! ECDC – Nieuwe applicatie ‘threat reports’

Het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) heeft een nieuwe applicatie voor smartphones ontwikkeld en op de markt gebracht: Threat Reports. De applicatie is gratis en publiek toegankelijk. Zij verzamelt alle recentste epidemiologische ECDC rapporten zoals de [risico-evaluaties](#), de [weekrapporten van overdraagbare ziekten](#) en epidemiologische rapporten. De applicatie biedt de mogelijkheid om verwittigd te worden bij publicatie van een nieuw rapport U kan de applicatie downloaden in Apple, Android en Windows Store.

Wereldwijd

Gele koorts – Epidemie in Brazilië

Er woedt een epidemie van [gele koorts](#) in Brazilië. Tussen 6 januari en 21 februari 2017 meldde het land 919 verdachte gevallen en 292 bevestigde gevallen van gele koorts, waarvan 209 gevallen overleden. Sinds het begin van de [epidemie](#) hebben zes zuidoostelijke staten van het land een autochtone transmissie gemeld. Het gezondheidsministerie startte met campagnes voor massale vaccinatie in de getroffen gebieden naast de routine vaccinatie. De WGO raadt aan om niet geïmmuniseerde mensen te vaccineren bij een reis naar de [staten van Brazilië](#) met lokale transmissie. In België geldt er meldingsplicht voor (autochtone gevallen van) gele koorts. Meer informatie vindt u in de [risk assessment](#) van het ECDC.